

## NÚCLEO PROFISSIONAL / ENFERMAGEM

### QUESTÃO 01

Segundo Garcia e Egry (2010) O raciocínio clínico é um fenômeno de alta complexidade que constitui um processo de pensamento e tomada de decisões clínicas em uma perspectiva integral para a prática clínica. Nesta perspectiva é INCORRETO afirmar que o raciocínio clínico:

- a) É entendido como processo e, por vezes, denominado como julgamento clínico ou raciocínio crítico;
- b) É empregado pelo enfermeiro no processo de estabelecer diagnósticos e intervenções, ou seja, nas tomadas de decisões clínicas;
- c) É considerado dinâmico, uma vez que, mediante sua utilização, busca-se a crescente compreensão da situação clínica como base para a intervenção;
- d) Engloba três dimensões: Cognição, conhecimento e metacognição que operam de forma harmoniosa;
- e) É entendido como raciocínio diagnóstico;

### QUESTÃO 02

Segundo Santos e Cubas (2012), a Ciência Enfermagem, é parte integrante de qualquer Linha de Cuidado, seja ela voltada a uma patologia, a um grupo de vulnerabilidade, ou mesmo na perspectiva de prevenção de um determinado agravo à saúde. Com base nesta afirmativa assinale a sentença INCORRETA:

- a) A Linha de Cuidado permite somente a organização dos fluxos e direcionamento dos usuários no sistema não permitindo atualizações destes fluxos e contra fluxos;
- b) A presença da Consulta de Enfermagem pode ser verificada ao longo de uma Linha de Cuidado como parte integrante de um todo assistencial direcionado a determinado grupo;
- c) Adotar a compreender a linha de Cuidado e, ao mesmo tempo, exigir mudanças nela quando necessário, bem como, cobrar o adequado desdobramento da Linha de Cuidado é um desafio para a enfermagem;
- d) A construção e o monitoramento da Linha de Cuidado deve ser ação conjunta com a comunidade, para se evitar o risco de ser mais uma “tentativa gráfica” de apenas entender o fluxo de pacientes;
- e) A existência da Consulta de Enfermagem de forma desarticulada, simplesmente anexa a uma Linha de Cuidado, não garante o impacto dessa prática;

### QUESTÃO 03

PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Segundo esta portaria e em relação as atribuições do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família é INCORRETO afirmar que:

- a) Realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias inclusive no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários quando indicado ou necessário, em todas as fases do desenvolvimento humano;
- b) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe de Saúde, sendo obrigatoriamente o enfermeiro, o gerente da equipe de saúde;
- c) realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços;
- d) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe;

- e) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;

#### QUESTÃO 04

Conforme a Resolução 358 do Cofen/2009. NÃO é fase do processo de Enfermagem:

- a) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem;
- b) Diagnóstico de Enfermagem;
- c) Diagnóstico Multidisciplinar;
- d) Planejamento de Enfermagem;
- e) Implementação e Avaliação de Enfermagem;

#### QUESTÃO 05

As vacinas VORH e HPV imunizam contra as seguintes doenças respectivamente:

- a) Diarreia por Rotavírus Humano e Infecção por Papilomavírus Humano;
- b) Diarreia por Rotavírus Humano e AIDS;
- c) Diarreia por Rotavírus R e Infecção por Papilomavírus Humano;
- d) Diarreia por Rotavírus Humano e Infecção por Papilomavírus B1;
- e) Diarreia por Rotavírus O e Infecção por Papilomavírus V;

#### QUESTÃO 06

As vacinas DPT + Hib e SRC imunizam contra as seguintes doenças respectivamente:

- a) Difteria, tétano, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e; Sarampo, rubéola e varicela;
- b) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e; Sarampo, rubéola e varicela;
- c) Difteria, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e; Sarampo, rubéola e caxumba;
- d) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e; Sarampo, rubéola e caxumba;
- e) Difteria, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b e; Sarampo, parotidite e caxumba;

#### QUESTÃO 07

Em 2014, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra o HPV no Calendário Nacional de Vacinação. O vírus HPV é a principal causa do câncer do colo de útero, o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto. Com a introdução da vacina no SUS, espera-se a redução da incidência e da mortalidade por essa doença. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) estimou o surgimento de 15 mil novos casos e cerca de 4,8 mil óbitos em 2014. Com a vacinação, também será possível a prevenção de verrugas genitais e outros tipos de câncer induzidos pelo HPV. A vacina adotada no SUS – chamada de quadrivalente – é altamente eficaz contra quais tipos de HPV?

- a) 6, 11, 16 e 19, sendo que os tipos 16 e 19 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo;
- b) 6, 11, 16 e 18, sendo que os tipos 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo;
- c) 6, 11, 16 e 18, sendo que os tipos 6 e 11 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo;
- d) 6, 11, 17 e 18, sendo que os tipos 17 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo;
- e) 6, 11, 18 e 19, sendo que os tipos 18 e 19 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero em todo mundo;

### QUESTÃO 08

Segundo o manual de controle das doenças transmissíveis os cuidados com o preservativo masculino são:

- I - Armazenar afastado do calor e observar integridade da embalagem, bem como o prazo de validade;
- II - Colocar antes da penetração, durante ereção peniana e manter o receptáculo existente na extremidade do preservativo apertado entre os dedos durante a colocação, retirando todo o ar do seu interior;
- III – Não usar lubrificantes de base aquosa (gel lubrificante), pois o uso de lubrificantes danifica o látex, ocasionando sua ruptura;
- IV - No caso de ruptura, o preservativo deve ser substituído imediatamente;

São CORRETAS

- a) I, II e III
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) I, II, III e IV
- e) I, III e IV

### QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA. O manual de controle das doenças transmissíveis Orienta que se observe no exame físico geral:

- a) Apenas as lesões ulceradas em alto relevo, avermelhada, hipercrômica, circular e irregular, principalmente na região perineal;
- b) Pele, mucosas, particularmente, a palma das mãos, plantas dos pés, mucosa orofaríngea e dos genitais;
- c) Quaisquer lesões (ulceradas ou não, em baixo ou alto relevo, avermelhada, hipercrômica, circular, irregular, circinada etc.), no abdômen, dorso, couro cabeludo e principalmente na região perineal;
- d) Sempre que possível, deverá ser feita aferição de pressão arterial e frequência cardíaca e palpação de mamas;
- e) Palpar os gânglios de todos os segmentos corporais (cabeça, tronco e membros);

### QUESTÃO 10

A orientação do INCA quanto à periodicidade do exame de colpocitologia oncótica deve ser:

- a) Sempre que surgir sintomatologia ginecológica.
- b) Em 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos.
- c) Semestral, independente de sintomatologia ginecológica.
- d) Em 1 ano, após 2 exames semestrais com resultados negativos.
- e) Sempre que a mulher sentir dor ou tiver sangramento.