

## NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ODONTOLOGIA

### QUESTÃO 01

Analise as afirmativas abaixo, em relação a Aplicação Tópica de Flúor, realizada pelo profissional.

I – Os produtos acidulados como géis e espumas, são mais reativos com a estrutura dental e desta forma, mais indicados do que os neutros.

II – Recomenda-se a utilização de flúor fosfato acidulado na concentração de 1,23%, em pacientes com restaurações estéticas, para aumentar o poder de penetração e conseqüentemente de proteção dental.

III – Os vernizes com flúor, embora menos reativos que os géis e espumas, permanecem mais tempo na superfície dental.

IV – O flúor na forma de espuma apresenta baixa densidade e um pH ligeiramente menor quando comparado ao flúor na forma de gel.

Assinale abaixo a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e IV.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 02

Paciente de 59 anos, portador de prótese total mandibular e maxilar apareceu na Unidade de Saúde, com dor a mastigação. Após o exame clínico, o cirurgião dentista constatou uma lesão avermelhada e ulcerada com bordas elevadas e levemente duras, localizada no fundo de sulco próximo a região retromolar. Na anamnese o paciente relatou ser tabagista e possuir a lesão por mais de 2 meses, porém sem sintomatologia dolorosa anterior. Conforme o relato do paciente o cirurgião dentista poderá suspeitar de qual patologia? Assinale a opção CORRETA.

- a) Afta
- b) Carcinoma epidermóide
- c) Candidíase pseudomembranosa
- d) Líquem plano
- e) Granuloma piogênico

### QUESTÃO 03

A Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SIDS) é definida como uma morte inesperada da criança, durante o sono, que foi inexplicada pelos exames pós-morte como inquérito, autópsia e exame da cena do crime. Sobre a SIDS assinale a opção INCORRETA.

- a) Colocar o bebê para dormir na posição prona (de barriga para baixo) auxilia na prevenção da SIDS.
- b) O uso de chupeta pelo bebê, durante o sono, protege reduzindo o risco da síndrome.
- c) O baixo peso ao nascer e a prematuridade são considerados fatores de risco.
- d) Os bebês que possuem maior risco são os do gênero masculino e com idade em torno de 2 a 4 meses.
- e) A idade materna pode estar relacionada como fator de risco, assim como o uso de drogas e o tabagismo durante a gestação.

### QUESTÃO 04

Os selantes têm sido comumente usados, por mais de três décadas, na prevenção da doença cárie, principalmente em superfícies oclusais de dentes pré-molares e molares. Sobre selantes assinale a opção CORRETA.

- a) Os selantes resinosos são aplicados diretamente sobre as fóssulas e fissuras, após condicionamento com ácido poliacrílico a 37%.
- b) Os selantes ionoméricos são indicados principalmente para o selamento dos primeiros molares permanentes parcialmente erupcionados.
- c) Para aumentar o poder de penetração do selante resinoso é necessária aplicação prévia de adesivo dental.
- d) A técnica de aplicação do selante resinoso é parcialmente sensível a contaminação salivar.
- e) Dos selantes, os ionoméricos são os que possuem maior retenção mecânica ao dente.

### QUESTÃO 05

O Brasil Sorridente é a política de saúde bucal do Sistema Único de Saúde (SUS), com progressivas articulações interministeriais, que visam ações, capazes de enfrentar as iniquidades e promover o acesso de populações em situação de vulnerabilidade. Acerca deste assunto analise as opções abaixo.

- I – Rede Cegonha
- II – Programa Viver Sem Limites
- III – Programa Saúde na Escola
- IV – Plano Brasil Sem Miséria

Assinale a alternativa CORRETA cujo(s) trabalho(s) exemplifica(m) a realização de ações do Brasil Sorridente.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 06

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é um procedimento minimamente invasivo que visa a promoção de saúde bucal, prevenção e tratamento dentário, muito utilizado na saúde pública, pois pode ser realizado em campo, sob luz natural, favorecendo, desta forma o acesso da população. O sucesso do ART depende de alguns requisitos, EXCETO:

- a) Do preparo e inserção correta do material restaurador.
- b) Da quantidade de tecido cariado a ser removido.
- c) Da experiência e habilidade profissional.
- d) Da extensão e localização da restauração.
- e) Do tipo de proteção pulpar utilizado na técnica.

### QUESTÃO 07

A PORTARIA Nº 599/GM DE 23 DE MARÇO DE 2006 define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs) e estabelecem critérios, normas e requisitos para seu credenciamento. De acordo com esta portaria analise as opções abaixo.

- I – Estabelece que o CEO tipo I, deve possuir no mínimo 4 consultórios odontológicos completos, para atendimento clínico e especializado.
- II – Define a obrigatoriedade do atendimento aos portadores de necessidades especiais.
- III – Determina que a endodontia e a periodontia especializada sejam realizadas, garantindo a integralidade.
- IV – Estabelece que os LRPDs realizem, no mínimo, prótese dentária total e / ou parcial removível.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Apenas III.
- b) Apenas IV.
- c) Apenas I.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I, II e IV.

### QUESTÃO 08

A portaria GM nº 2.488/11, que trata da Política Nacional da Atenção Básica, relata as especificidades dos profissionais que compõem a Equipe de Saúde Bucal (ESB) nas Estratégias Saúde da Família (ESF). Sobre as especificidades assinale a alternativa CORRETA.

- a) A ESB modalidade I é composta pelo Cirurgião dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, Técnico em Saúde Bucal (TSB) e a Auxiliar em Saúde Bucal (ASB).
- b) A ESB modalidade III é composta pelos profissionais das modalidades I ou II que operam em Unidade Odontológica Móvel.
- c) O cirurgião dentista faz parte da equipe mínima de profissionais que compõem uma ESF, exigida pelo Ministério da saúde.
- d) A ESB cuida da mesma população adscrita a ESF, porém o território é diferente e mais abrangente.

e) A carga horária do Cirurgião dentista que compõe a ESB é de 32 horas semanais e da Auxiliar em Saúde Bucal é de 40 horas.

#### QUESTÃO 09

A Portaria nº 562, de 4 de abril de 2013 define o valor mensal integral do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), denominado como componente de qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB variável). De acordo com esta portaria, assinale a opção CORRETA.

- a) O Piso de Atenção Básica Variável é definido de acordo com a população residente em cada município.
- b) Estipula que a Equipe de Saúde Bucal é responsável pela mesma população que a Estratégia Saúde da Família (ESF) e desta forma o valor a ser repassado é de R\$ 8.500,00, ou seja, o mesmo para ambas as equipes.
- c) O PAB variável fica atrelado a uma produção mínima de procedimentos odontológicos e, quanto mais procedimento preventivo for realizado, maior é o valor a ser repassado por mês e por equipe.
- d) Define o valor mensal integral do incentivo financeiro do PMAQ-AB em R\$ 2.500,00 por Equipe de Saúde Bucal vinculada a 1 (uma) ou a 2 (duas) Equipes de Atenção Básica.
- e) Determina que o PAB variável, do PMAQ-AB será de R\$ 3.000,00, por Equipe de Saúde Bucal modalidade II, desde que realizem a produção mínima estipulada no ANEXO da Portaria.

#### QUESTÃO 10

O aleitamento materno é essencial para o crescimento do bebê, pois estimula muito mais o sistema oral motor sensorial, devida a força muscular necessária para a ordenha ser bem maior quando comparada ao aleitamento artificial por mamadeira. Sobre os benefícios do aleitamento materno assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O aleitamento materno é imprescindível para o correto desenvolvimento da articulação temporomandibular, dos maxilares e da oclusão.
- b) O aleitamento é fator decisivo para a correta maturação e crescimento das estruturas orais.
- c) Com o ato da ordenha há uma estabilização do prognatismo mandibular, específico do recém-nascido, favorecendo posteriormente a oclusão.
- d) Na amamentação o bebê chega a executar de 2.000 a 3.500 movimentos de ordenha, enquanto que na alimentação artificial por mamadeira os movimentos não ultrapassam 2.000.
- e) Com a amamentação o retrognatismo mandibular deve ser anulado e normalizado até a erupção dos primeiros incisivos permanentes.