


NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ODONTOLOGIA

QUESTÃO 11: Na tabela e gráfico abaixo, são apresentados dados do último levantamento epidemiológico em saúde bucal realizado na população brasileira - Projeto SB Brasil 2010.

Tabela 1. Proporção de indivíduos com ceo-d/CPO-D = 0 segundo idade e região. Brasil, 2010.

Idade	5 anos	12 anos	15 a 19 anos	35 a 44 anos	65 a 74 anos
	%	%	%	%	%
Região					
Norte	33,9	28,0	12,1	0,7	0,4
Nordeste	41,6	37,7	22,9	0,8	0,1
Sudeste	51,9	48,4	26,7	1,0	0,0
Sul	39,4	40,9	24,7	0,9	0,7
Centro-Oeste	38,8	35,6	16,0	0,7	0,2
Brasil	46,6	43,5	23,9	0,9	0,2

Figura 1. Média do CPO-D aos 12 anos segundo região. Brasil, 2010.



De acordo com os dados apresentados, analise as afirmativas abaixo e na sequência assinale a alternativa CORRETA:

I - Há uma tendência de aumento da proporção de indivíduos livres de cárie em função do aumento da idade.

II - Mais da metade das crianças brasileiras de 5 anos possuem experiência de cárie.

III - A proporção de adultos livres de cárie é maior na região Sudeste, quando comparada às demais regiões brasileiras.

IV - Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que a proporção de dentes cariados é igual nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 12: A realização do CPO-D, para verificar a prevalência da doença cárie em escolares, é de suma importância para o planejamento de ações em saúde bucal. Em se tratando do Planejamento Estratégico Situacional (PES), em qual momento dele se enquadra esta realização do CPO-D? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Tático - operacional
- b) Estratégico
- c) Explicativo
- d) Normativo
- e) Deliberativo

QUESTÃO 13: O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é um programa desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para países com comunidades economicamente desfavorecidas ou marginalizadas (FRENCKEN et al., 1996). Sobre a técnica do ART assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Trata-se de um método que implica limitação da dor, minimizando a necessidade de se utilizar anestesia.
- b) Trata-se de um método biológico que envolve apenas a remoção de estruturas dentárias descalcificadas.
- c) Nesta técnica a remineralização da dentina infectada está diretamente relacionada ao selamento hermético da cavidade de cárie.
- d) É considerado um método anticariogênico, devido à liberação de flúor proporcionada pelo cimento de ionômero de vidro.
- e) Na técnica utiliza-se um cimento odontológico com coeficiente de expansão térmico-linear semelhante a estrutura dentária.

QUESTÃO 14: Os selantes são substâncias colocadas nas fósulas e fissuras, a fim de formar uma barreira mecânica, que impede o acúmulo de biofilme e, conseqüentemente permite uma melhor higienização, prevenindo a ocorrência e ou progressão de lesões cáries. Sobre o selamento de dentes com lesão de cárie em metade externa de dentina assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O cimento de ionômero de vidro é o material de primeira escolha para o selamento de fósulas e fissuras, a longo prazo, de lesões de cárie em metade externa de dentina.
- b) Para o sucesso da técnica é indispensável a profilaxia das fósulas e fissuras, previamente à aplicação do selante.
- c) O condicionamento da face oclusal é realizado com ácido fosfórico a 37%.
- d) Os selantes devem ser feitos preferencialmente com isolamento absoluto, pois o sucesso da técnica depende de um campo operatório seco.
- e) Após o desenvolvimento da técnica, é necessário realizar exames radiográficos periódicos do dente selado para se comparar à radiografia inicial.

QUESTÃO 15: De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, o cirurgião dentista precisa realizar o atendimento odontológico à gestante. Sobre este atendimento analise as afirmações abaixo.

I - O atendimento de gestantes no terceiro trimestre deve ser realizado, com a mesma, em posição supina, para evitar a compressão excessiva da veia cava inferior.

II - O anestésico local de escolha, considerado "padrão ouro", é a lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000 UI.

III - A utilização de paracetamol, para casos de dor, é compatível com a gestação quando em pequenas doses e por pouco tempo.

IV - Em qualquer trimestre de gestação a radiografia odontológica poderá ser realizada desde que se utilize a proteção com avental plumbífero.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas a I e a II.
- b) Apenas a II, III e IV
- c) Apenas a IV
- d) Apenas I, II e IV
- e) Todas estão corretas.

QUESTÃO 16: Em janeiro de 2004 foram criadas as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal que embasaram a política conhecida com Brasil Sorridente. O documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde dá diretrizes para organizar a atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde e constitui-se como o eixo político básico de proposição para reorientar as concepções e práticas no campo da saúde bucal. Sobre esta política analise as afirmações abaixo.

- I- Possui como meta a produção do cuidado.
- II- Não deve ser uma assistência centrada nos doentes, mas sim na promoção de qualidade de vida e intervenção dos fatores que a colocam em risco.
- III- As ações e serviços devem resultar do conhecimento da realidade de saúde local e dos recursos para prevenção, promoção e recuperação.
- IV- Um de seus pressupostos é acompanhar o impacto das ações por meio de indicadores.

Assinale a alternativa CORRETA

- a) Apenas I, II e III
- b) Apenas II e IV
- c) Apenas I, II e IV
- d) Apenas a I
- e) Todas estão corretas

QUESTÃO 17: O Índice Periodontal Comunitário (CPI) permite avaliar a condição periodontal quanto a higidez, sangramento e presença de cálculo ou bolsa. Sobre a realização deste Índice, em levantamentos epidemiológicos periodontais assinale a alternativa CORRETA.

- a) O exame clínico deve ser realizado por sextante e pode-se utilizar qualquer modelo de sonda periodontal.
- b) Em adultos jovens os terceiros molares são considerados dentes índices por estarem em boca, por um menor período de tempo, em relação aos demais.
- c) Pelo menos seis pontos são examinados em cada um dos dentes índices.
- d) O uso deste índice é específico para a dentição mista.
- e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 18: Sobre o processo de trabalho em saúde bucal, conforme as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, e a ampliação e qualificação da assistência assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O cirurgião dentista deve maximizar sua hora clínica assistencial em 75% a 85%.
- b) Deve garantir o atendimento de urgência na Atenção Básica.
- c) Adequar recursos necessários ao fluxo de demanda local.
- d) Promover a integralidade da atenção
- e) As ações coletivas de educação em saúde bucal devem ser realizadas preferencialmente pelo cirurgião dentista.

QUESTÃO 19: Baseando-se no disposto pela Portaria nº 599 de 23 de março de 2006 do Ministério da Saúde, a qual define a implantação de Especialidades Odontológicas (CEOs) e de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPDs), assinale a alternativa que NÃO apresenta uma atividade mínima a ser desenvolvida pelos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

- a) Odontopediatria especializada.
- b) Cirurgia oral menor.
- c) Periodontia especializada.
- d) Endodontia.
- e) Atendimento às pessoas com necessidades especiais.

QUESTÃO 20: O diagnóstico precoce é um dos aspectos mais importantes na prevenção e no tratamento do câncer bucal. Essa doença, no Brasil, ainda afeta uma considerável parcela da população, principalmente as classes menos favorecidas. São vários os fatores que podem levar ao câncer de boca. Analise as afirmativas abaixo, sobre câncer bucal e assinale a opção INCORRETA.

- a) O consumo de fumo e álcool concomitante torna ainda maior o risco de desenvolvimento de neoplasia maligna.
- b) O trabalho da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção – Quadro (CONICQ), que foi precedida pela Comissão Nacional para Controle do Uso do Tabaco (CNCT), trouxe avanços significativos no controle do tabaco no Brasil.
- c) O Papiloma Vírus Humano (HPV), a higiene oral precária e a inalação de solventes são fatores associados ao câncer de boca e da orofaringe.
- d) Embora quantitativamente o câncer de boca encontre-se aquém da doença cárie, da doença periodontal, das deformidades dentofaciais e das fissuras labiopalatinas, ele pode ser subestimado como um problema de saúde pública, devido o seu alto índice de morbimortalidade.
- e) O carcinoma espinocelular da cavidade oral, por vezes assume importantes extensões, tornando-se imprescindível a realização de biópsia incisional seguida do exame histopatológico para que seja realizado o tratamento adequado.