

ATENÇÃO BÁSICA / SAÚDE DA FAMÍLIA

NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

QUESTÃO 11

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica são atribuições específicas do Enfermeiro:

I – Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, em domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;

II – A atenção em saúde deve ocorrer em todas as fases de desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

III – Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços;

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe;

V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe;

São CORRETAS as afirmativas encontradas apenas nos itens:

- a) I, II, IV, V
- b) I, II, V
- c) II, III, IV
- d) I, II, III, IV, V
- e) II, III, V

QUESTÃO 12

A imunização contra a hepatite B é realizada em:

- a) Uma única dose da vacina e de ver aplicada logo após o nascimento.
- b) Duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.
- c) Uma dose em qualquer idade, sendo necessário uma dose de reforço a cada 10 anos.
- d) Três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose.
- e) Três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e segunda dose e de um mês entre a segunda e a terceira dose.

QUESTÃO 13

Sobre a imunização contra a febre amarela são feitas as seguintes afirmações:

I - A vacina febre amarela de uso eventual deve não deve ser administrada em mulheres com filhos menores de 6 meses em amamentação.

II - A vacina febre amarela não tem eficácia e segurança estabelecidas para pacientes portadores de HIV.

III – Para portadores de HIV, a vacina febre amarela somente é indicada quando a contagem de LT CD4 + for maior que 350 células/mm³ em adolescentes e adultos, e na ausência de alteração imunológica em menores de 13 anos.

IV – Recomenda-se que mulheres que estão amamentando adiem vacinação contra febre amarela até o filho completar 6 meses de idade. Quando não se pode adiar a vacinação contra febre amarela é recomendado evitar amamentar por 7 dias após a vacinação.

São corretas apenas as alternativas:

- a) I e II
- b) I e IV
- c) I, II e IV
- d) I, II e III
- e) I, II, III e IV

QUESTÃO 14

A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a “Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado de enfermagem”. Assinale a alternativa que contempla a fase denominada “Avaliação de Enfermagem”.

- a) Realização das ações ou intervenções determinadas no planejamento.
- b) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação das mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.
- c) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença.
- d) Processo deliberado, sistemático e contínuo, com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença.
- e) Processo de interpretação e agrupamento de dados coletados, que culmina com a tomada de decisão, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções ou intervenções.

QUESTÃO 15

João é enfermeiro em uma Estratégia de Saúde da Família e recebeu Maria, uma jovem gestante. Maria teve resultado positivo de infecção pelo HIV pelo teste rápido. Diante dessa situação, João desenvolveu as seguintes ações:

I – Orientou Maria quanto as ações de prevenção de transmissão vertical do HIV antes , durante e após o parto;

II – Orientou Maria que ela não poderá amamentar seu filho;

III – O recém-nascido de Maria deverá receber AZT solução oral por 5 semanas e será acompanhado pelo serviço de referência;

- a) I e III são incorretas
- b) I e III são corretas
- c) I e II são incorretas
- d) II e III são corretas
- e) I e II são corretas

QUESTÃO 16

Sobre a hanseníase é INCORRETO afirmar que:

- a) É uma doença de progressão lenta, podendo levar de 2 a 5 anos entre o momento do contato com a pessoa contaminada e os primeiros sinais da doença;
- b) Entre os principais sinais da doença podem ser citadas as manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, com alteração da sensibilidade;
- c) Casos com até cinco lesões na pele são considerados paucibacilares e aqueles com cinco ou mais lesões são considerados multibacilares;
- d) Os principais trocos nervosos acometidos na hanseníase são facial e trigêmeo em face, radial, ulnar e mediano em membros superiores e em membros inferiores fibular e tibial;
- e) O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica de Saúde é essencialmente clínico por meio do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos.

QUESTÃO 17

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o cuidado na gestação e no parto normais deve ser:

- a) medicalizado de acordo com as necessidades de cada gestante ou puérpera;
- b) pautado nos protocolos nacionais, sendo a referência os centros de cuidado primário;
- c) integral e levar em conta necessidades intelectuais, emocionais, sociais e culturais das mulheres, seus filhos e famílias, e não somente um cuidado biológico
- d) centrado no binômio mãe-bebê, com foco nas necessidades intelectuais, emocionais, sociais e culturais desses.
- e) tomada de decisão baseada em evidências, o que significa ser embasado pela melhor evidência científica disponível, e por estudos controlados aleatorizados, quando seja possível, e apropriado.

QUESTÃO 18

Segundo a NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 2015-2017 no seu domínio 4, classe 1: Alteração no padrão de sono, Despertar não intencional, Dificuldade no funcionamento diário, Dificuldade para iniciar o sono, Insatisfação com o sono e Não se sentir descansado são características definidoras de:

- a) Insônia
- b) Privação de sono
- c) Padrão de sono prejudicado
- d) Disposição para sono melhorado
- e) Nenhuma das alternativas anteriores

QUESTÃO 19

As taxonomias de enfermagem são linguagens padronizadas e nomenclaturas científicas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a assistência de enfermagem. Segundo a classificação taxonômica da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), o diagnóstico de enfermagem compõe-se:

- a) das intervenções de enfermagem independentes ou interdependentes do indivíduo, família e comunidade.
- b) das intervenções de enfermagem em todos os cenários e especialidades da prática.
- c) das intervenções de cuidados diretos e indiretos.
- d) da condição de saúde de um paciente, do cuidador e da família ou da comunidade.
- e) por título, definição, características definidoras e fatores relacionados.

QUESTÃO 20

O acidente vascular encefálico tem como principais fatores de risco:

- a) Hipoxia, ataxia e disfagia;
- b) Hipertensão, hipercolesterolemia e tabagismo;
- c) Afasia global, disfunção vesical e obesidade;
- d) Diabetes, cardiopatia e afasia global;
- e) Alcoolismo, hipotensão e intubação orotraqueal .