

## **ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA.**

### **NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: FARMÁCIA**

#### **QUESTÃO 11**

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) atualmente é regulamentado pela Portaria GM/MS no 1.554 de 30 de julho de 2013, alterada pela Portaria GM/MS no 1.996 de 11 de setembro de 2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS. Em relação a este componente pode-se afirmar que:

- I. Os medicamentos deste componente são classificados em 3 grupos, divididos segundo a responsabilidade por seu financiamento.
  - II. Todos os medicamentos do Grupo 1 são adquiridos e financiados pelo Ministério da Saúde.
  - III. O Grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade de compra e financiamento é da Secretaria Estadual de Saúde (SES).
  - IV. O fornecimento destes medicamentos devem seguir os parâmetros de diagnóstico, indicação e tratamento definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde.
- a) As afirmativas I e IV estão corretas.
  - b) As afirmativas III e IV estão corretas.
  - c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - e) Todas as afirmativas estão corretas.

#### **QUESTÃO 12**

O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS. Os recursos federais do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica são constituídos por:

- a) Parte Financeira Fixa e Parte Financeira Variável.
- b) Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
- c) Programa de Doenças Infecciosas, Programa de Doenças Parasitárias e Programa de Doenças Excepcionais.
- d) Cuidados da Atenção Básica, Saúde Mental e Saúde da Mulher.
- e) Programa de Hipertensão e Diabetes, Programa de Asma e Rinite e Combate ao Tabagismo.

#### **QUESTÃO 13**

Uma das causas que afetam a estabilidade dos medicamentos é a ocorrência de reações químicas que alteram a estrutura do fármaco, podendo gerar produtos de degradação, os quais podem ser terapeuticamente inativos ou tóxicos. Temperatura, luz e umidade são fatores que podem atuar nas reações de degradação. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Recomenda-se estocar os medicamentos em local fresco, ventilado e longe de fontes de calor e umidade.
  - II. Medicamentos termolábeis devem ser armazenados em locais com temperatura controlada, entre 0 a 10 graus Celsius.
  - III. Para o monitoramento da temperatura do ambiente e dos equipamentos são utilizados termômetros e o registro das temperaturas deve ser realizado diariamente, em diferentes momentos do dia.
- a) Apenas a afirmativa I está correta.
  - b) Apenas a afirmativa III está correta.
  - c) As afirmativas II e III estão corretas.
  - d) As afirmativas I e III estão corretas.
  - e) Todas as afirmativas estão corretas.

#### **QUESTÃO 14**

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde tem por finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Em relação a este contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Identificação do paciente, identificação do prescritor e legibilidade são itens fundamentais na verificação de prescrições seguras.
  - II. Prescrições manuais podem aumentar a segurança no uso de medicamentos e devem ser adotadas quando possível.
  - III. A existência de uma lista de medicamentos padronizados no estabelecimento de saúde e a prescrição destes medicamentos selecionados e padronizados aumentam a segurança do uso, em virtude da maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de enfermagem com esses medicamentos.
  - IV. Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.
  - V. A via de administração pode ser prescrita por meio de abreviaturas, mesmo que as mesmas não estejam padronizadas no estabelecimento de saúde.
- a) As afirmativas I e III estão corretas.
  - b) As afirmativas I, IV e V estão corretas.
  - c) As afirmativas I e IV estão corretas.
  - d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
  - e) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

#### **QUESTÃO 15**

Os estudos em Farmacovigilância têm por objetivo gerar informação que possibilite a detecção, compreensão e prevenção das reações adversas a medicamentos. Considerando que diferentes desenhos de estudo podem ser utilizados nas investigações em Farmacovigilância, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. No estudo de coorte a medida utilizada para quantificar associação entre a reação adversa e o medicamento suspeito é denominada razão de chances.
  - II. Nos estudos ecológicos a associação observada entre o uso do medicamento e a ocorrência de reação adversa em dada população reflete a associação no nível individual
  - III. Nos estudos do tipo caso-controlé comparam-se pessoas que apresentam reação adversa com outras sem esta condição e investiga-se a exposição ao medicamento suspeito
- a) Apenas a alternativa I está correta.
  - b) Apenas a alternativa III está correta.
  - c) As alternativas I e III estão corretas.
  - d) As alternativas II e III estão corretas.
  - e) Nenhuma alternativa está correta.

### **QUESTÃO 16**

Para uma suspensão de amoxicilina 5mg/ml, considerando posologia de 5ml três (3) vezes ao dia, por cinco (5) dias é correto afirmar:

- I. O paciente está tomando 25mg de amoxicilina a cada dose.
- II. Se for necessário preparar 200ml desta suspensão será utilizado 1 grama de amoxicilina.
- III. Ao término do tratamento, o paciente tomou 125mg de antibiótico.
- IV. O paciente está tomando uma dose diária de 15mg.

Está(ão) correta(s):

- a) apenas I e IV.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e IV.
- e) apenas I, II e III.

### **QUESTÃO 17**

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), condição clínica multifatorial, com alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada um dos principais fatores de risco cardiovascular modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. Estudos clínicos demonstraram que a detecção, o tratamento e o controle da HAS são fundamentais para a redução dos eventos cardiovasculares. Deste modo, o objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Assim, os anti-hipertensivos devem não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Os diuréticos reduzem a pressão arterial por meio da depleção do sódio corporal e diminuição do volume sanguíneo.
- II. Os agentes simpaticoplégicos baixam a pressão arterial por meio da redução da resistência vascular periférica, inibição da função cardíaca e aumento do acúmulo venoso nos vasos de capacitância.

III. Os vasodilatadores diretos bloqueiam a produção ou ação da angiotensina, reduzindo a resistência vascular periférica e o volume sanguíneo.

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) Apenas a alternativa I está correta.
- e) Apenas a alternativa II está correta.

### **QUESTÃO 18**

“É um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos.” O texto define:

- a) Central de Medicamentos.
- b) Assistência Farmacêutica.
- c) Atenção Básica.
- d) Vigilância Epidemiológica.
- e) Vigilância Medicamentosa.

### **QUESTÃO 19**

De acordo com a Resolução 585 de agosto de 2013 que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, analise as seguintes afirmativas:

- I. As atribuições clínicas constituem prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no CRF de sua jurisdição.
- II. As atribuições clínicas do farmacêutico visam à promoção, proteção e recuperação da saúde.
- III. O farmacêutico exerce sua atividade sem autonomia, sendo subordinado à outro profissional de saúde;
- IV. O farmacêutico, no exercício das atribuições clínicas, tem o dever de contribuir para a geração, difusão e aplicação de novos conhecimentos que promovam a saúde e o bem-estar do paciente, da família e da comunidade.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas
- b) Todas as alternativas estão erradas
- c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas
- d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas
- e) Somente as alternativas III e IV estão corretas

### **QUESTÃO 20**

Para uma criança com quadro de rinite alérgica foi prescrito um xarope de fexofenadina. A dose prescrita foi de 30mg de 12 em 12 horas por 5 dias. Este medicamento é comercializado na concentração de 6mg/mL em frascos de 60, 150 e 300 mL. Qual o volume em mL que esta criança deve tomar em cada horário? E quantos frascos devem ser dispensados para o cumprimento deste tratamento?

- a) 10mL e 1 frasco de 150mL
- b) 3mL e 1 frascos de 60mL
- c) 0,5mL e 1 frasco de 60mL
- d) 5mL e 1 frasco de 60mL
- e) 1,0mL e 1 frasco de 150mL