

SAUDE COLETIVA

NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: FARMÁCIA

QUESTÃO 11

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Em relação a este componente, assinale a alternativa correta:

I. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas.

II. Os medicamentos do Grupo 3 são de responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios e compõem parte do elenco do Componente Básico da Assistência Farmacêutica regulamentado por ato normativo específico, sendo disponibilizados, em caso de demanda, para a garantia das linhas de cuidado definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde.

III. A execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica envolve as etapas de solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento.

IV. Para os medicamentos constantes dos Grupos 1 e 2, a execução é descentralizada e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sendo realizada de acordo com os critérios definidos na Portaria GM/MS 1554 e na legislação vigente.

- a) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) As afirmativas II e IV estão corretas.
- d) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 12

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se a aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde. De acordo com a Portaria GM/MS 1555 que estabelece o financiamento e execução deste Componente, assinale a alternativa incorreta:

- a) O financiamento deste componente é de responsabilidade das 3 esferas de governo.
- b) Os recursos financeiros oriundos do Ministério da Saúde são transferidos a cada ente federativo beneficiário em parcelas mensais correspondentes a 1/12 do valor total anual a eles devido.
- c) O financiamento, aquisição e distribuição da insulina humana NPH e da insulina humana regular é de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde.

- d) O Ministério da Saúde disponibiliza o HÓRUS, um sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, com o objetivo de dar suporte a gestão deste componente.
- e) As ações, os serviços e os recursos financeiros relacionados à Assistência Farmacêutica devem constar nos instrumentos de Planejamento do SUS: Plano de Saúde, Programação Anual e Relatório Anual de Gestão.

QUESTÃO 13

De acordo com a Resolução 585 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, são atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo, exceto:

- a) Promover consulta farmacêutica em ambiente que garanta a privacidade de atendimento.
- b) Fazer anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o propósito de realizar diagnóstico clínico.
- c) Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a finalidade de monitorar os resultados de farmacoterapia.
- d) Elaborar o plano de cuidado farmacêutico do paciente.
- e) Fazer a evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente.

QUESTÃO 14

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde tem por finalidade promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Em relação a este contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Identificação do paciente, identificação do prescritor e legibilidade são itens fundamentais na verificação de prescrições seguras.
 - II. Prescrições manuais podem aumentar a segurança no uso de medicamentos e devem ser adotadas quando possível.
 - III. A existência de uma lista de medicamentos padronizados no estabelecimento de saúde e a prescrição destes medicamentos selecionados e padronizados aumentam a segurança do uso, em virtude da maior familiaridade dos prescritores, farmacêuticos e equipe de enfermagem com esses medicamentos.
 - IV. Para medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de creatinina, recomenda-se que o prescritor anote tais informações na prescrição, para facilitar a análise farmacêutica e a assistência de enfermagem.
 - V. A via de administração pode ser prescrita por meio de abreviaturas, mesmo que as mesmas não estejam padronizadas no estabelecimento de saúde.
- a) As afirmativas I e III estão corretas.
 - b) As afirmativas I, IV e V estão corretas.
 - c) As afirmativas I e IV estão corretas.
 - d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
 - e) As afirmativas I, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 15

Para uma criança de 30 kg foi prescrito um xarope na dose de 0,6 mg/kg/dia a ser administrado de 8 em 8 horas. O volume em mL a ser administrado para a criança em cada horário é de 2mL. Qual a concentração deste xarope?

- a) 1,0mg/mL
- b) 3mg/mL
- c) 0,2mg/mL
- d) 2mg/mL
- e) 0,3mg/mL

QUESTÃO 16

Uma mãe chega a farmácia com uma receita de antibiótico para seu filho de 4 anos. A dose prescrita pelo médico é de 80mg/kg/dia a ser dada de 6/6horas por 10 dias. Sabemos que a criança pesa 15kg e o frasco tem 150mg/5ml, volume do frasco de 100ml. Deve-se concluir que:

- I - a cada 6 horas, a criança irá tomar uma dose de 0,3g de antibiótico.
- II - ao término do tratamento, o paciente tomou 3 g de antibiótico.
- III - de acordo com a posologia médica, ocorreu uma ingestão diária de 1200 mg de antibiótico.
- IV - Para 10 dias de tratamento, a mãe deverá comprar 3 frascos de 100ml do antibiótico.
- V – A cada 6 horas, a criança vai tomar 10ml do medicamento.

Está(ão) correta(s):

- a) As alternativas I, III e IV.
- b) As alternativas I, III e V.
- c) As alternativas I, IV e V.
- d) As alternativas I, III, IV e V.
- e) As alternativas II e III e V.

QUESTÃO 17

Atualmente estima-se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 387 milhões e que alcance 471 milhões em 2035. Cerca de 80% desses indivíduos vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade e há crescente proporção de pessoas acometidas em grupos etários mais jovens, as quais coexistem com o problema que as doenças infecciosas ainda representam (Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015-2016). Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta:

- a) As biguatingas são recomendadas como terapia de primeira linha para o diabetes tipo II. Como é um agente poupador de insulina, que não aumenta o peso corporal nem provoca hipoglicemia. Seus efeitos tóxicos mais comuns são gastrointestinais.
- b) Os programas de prevenção terciária do Diabetes Mellitus tipo II baseiam-se em intervenções na dieta e na prática de atividades físicas, visando combater o excesso de peso em indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes.
- c) A glibenclamida, uma sulfoniluréia, apresenta poucos efeitos colaterais, apesar de seu potencial de causar hipoglicemia.

- d) A insulina regular humana, de ação curta, e a insulina NPH, de ação intermediária, também são utilizadas no tratamento do diabetes.
- e) Entre as medidas de prevenção secundárias do diabetes, podemos citar o tratamento farmacológico, que reduz substancialmente o risco de complicações.

QUESTÃO 18

Os estudos em Farmacovigilância têm por objetivo gerar informação que possibilite a detecção, compreensão e prevenção das reações adversas a medicamentos. Considerando que diferentes desenhos de estudo podem ser utilizados nas investigações em Farmacovigilância, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. No estudo de coorte a medida utilizada para quantificar associação entre a reação adversa e o medicamento suspeito é denominada razão de chances.
 - II. Nos estudos ecológicos a associação observada entre o uso do medicamento e a ocorrência de reação adversa em dada população reflete a associação no nível individual
 - III. Nos estudos do tipo caso-controle comparam-se pessoas que apresentam reação adversa com outras sem esta condição e investiga-se a exposição ao medicamento suspeito
- a) Apenas a alternativa I está correta.
 - b) Apenas a alternativa III está correta.
 - c) As alternativas I e III estão corretas.
 - d) As alternativas II e III estão corretas.
 - e) Nenhuma alternativa está correta.

QUESTÃO 19

Uma das causas que afetam a estabilidade dos medicamentos é a ocorrência de reações químicas que alteram a estrutura do fármaco, podendo gerar produtos de degradação, os quais podem ser terapeuticamente inativos ou tóxicos. Temperatura, luz e umidade são fatores que podem atuar nas reações de degradação. Nesse contexto, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Recomenda-se estocar os medicamentos em local fresco, ventilado e longe de fontes de calor e umidade.
 - II. Medicamentos termolábeis devem ser armazenados em locais com temperatura controlada, entre 0 a 10 graus Celsius.
 - III. Para o monitoramento da temperatura do ambiente e dos equipamentos são utilizados termômetros e o registro das temperaturas deve ser realizado diariamente, em diferentes momentos do dia.
- a) Apenas a afirmativa I está correta.
 - b) Apenas a afirmativa III está correta.
 - c) As afirmativas II e III estão corretas.
 - d) As afirmativas I e III estão corretas.
 - e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 20

“É um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos.” O texto define:

- a) Central de Medicamentos.
- b) Assistência Farmacêutica.
- c) Atenção Básica.
- d) Vigilância Epidemiológica.
- e) Vigilância Medicamentosa.