



UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA

EDITAL SAÚDE COLETIVA
NÚCLEO PROFISSIONAL/ ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

Questão 11

Segundo Cubas e Santos (2012), a Ciência enfermagem, é parte integrante de qualquer Linha de Cuidado, podendo ser voltada a uma patologia, a grupo em vulnerabilidade, ou ainda na perspectiva de prevenção de um determinado agravo à saúde. Considerando essas informações, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A Linha de cuidado permite somente a organização dos fluxos e direcionamento dos usuários no sistema não permitindo atualizações destes fluxos e contra fluxos;
- () A consulta de enfermagem pode ser verificada ao longo de uma linha de cuidado como parte integrante de um todo assistencial direcionado a determinado grupo;
- () É um desafio para a enfermagem a adoção e compreensão da Linha de Cuidado, e simultaneamente realizar mudanças nela quando se percebe necessidade, bem como, cobrar o adequado desdobramento da linha;
- () A construção da Linha de Cuidado é responsabilidade do enfermeiro, sendo o seu monitoramento resultado de uma ação conjunta da equipe de saúde, com participação da comunidade;
- a) V – V – V – F
b) F – V – V – F
c) V – V – F – V
d) F – F – V – F
e) F – V – V – V

Questão 12

A coleta de dados e formulação de diagnósticos de enfermagem demarca uma área de atuação própria e independente da profissão. Um dos modelos que vem se difundindo amplamente pelo mundo é a Taxonomia da *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA). Leia as afirmativas abaixo:

- I. O enfermeiro deve focalizar os dados necessários à identificação das respostas e experiências humanas.
- II. Os achados que sustentam os diagnósticos devem ser baseados em pesquisas e outras evidências.
- III. As hipóteses diagnósticas são analisadas ao longo do processo de coleta de dados e utilizadas junto com um guia formal de coleta de dados para a geração dos dados necessários aos diagnósticos.
- IV. Por ser uma área de atuação exclusiva do enfermeiro, a coleta de dados deve ser feita sem a participação do indivíduo, da família ou da comunidade.
- V. Em uma coleta completa, os diagnósticos somente são concluídos quando as hipóteses terminam, e a investigação de cada padrão informa o enfermeiro e o paciente sobre as hipóteses diagnósticas.

São corretas apenas as afirmativas:

- a) I, II, III e V
b) I, II, e III
c) II, III e IV
d) II, III e V
e) I, II, III e IV

Questão 13

Você é enfermeiro de uma Estratégia de Saúde da Família e recebeu uma jovem gestante na unidade de saúde. A gestante teve resultado positivo de infecção pelo HIV em teste rápido realizado por você. Diante dessa situação, você desenvolve as seguintes ações:

I – Orienta a gestante quanto as ações de prevenção de transmissão vertical do HIV antes, durante e após o parto;

II – Orienta a gestante que ela não poderá amamentar seu filho;

III – O recém-nascido deverá receber AZT solução oral por 5 semanas e será acompanhado pelo serviço de referência;

- a) I e III são incorretas
- b) I e II são corretas
- c) I e III são corretas
- d) I e II são incorretas
- e) II e III são corretas

Questão 14

A respeito da tuberculose, assinale a opção CORRETA.

- a) O exame sorológico anti-HIV deve ser oferecido a todos pacientes com diagnóstico de tuberculose confirmado.
- b) As drogas utilizadas nos esquemas padronizados pelo Ministério da Saúde para tratamento da tuberculose são isoniazida, etambutol, neomicina, despacilina e penicilina cristalina.
- c) A maioria dos casos curados de tuberculose necessita de controle pós-tratamento, devendo-se orientar o paciente a retornar ao serviço de saúde sempre que surgirem sintomas da doença.
- d) A associação HIV/tuberculose não constitui problema de saúde pública, podendo levar à diminuição da morbidade e mortalidade em muitos países.
- e) O tratamento da tuberculose deve ser feito em regime hospitalar, supervisionado, no serviço de saúde mais próximo da residência do paciente.

Questão 15

Na avaliação do pé diabético é possível classificar o risco e seguir os cuidados recomendados, adequados à classificação. Considere as recomendações abaixo:

- I. Em todos os graus da classificação de risco se deve considerar o uso de calçados adaptados;
- II. A perda de sensibilidade protetora dos pés está presente apenas nos graus 2 e 3;
- III. No grau 2 há doença arterial periférica e a recomendação de acompanhamento é bimestral ou trimestral na atenção básica, o encaminhamento ao cirurgião vascular deve ser avaliado.
- IV. No grau 3 o acompanhamento recomendado é mensal ou bimestral na atenção básica ou com médico especialista, porém a periodicidade da avaliação deve ser adaptada individualmente, considerando os aspectos referentes a capacidade de autocuidado do indivíduo.

Assinale a alternativa correta:

- a) I e II estão corretas
- b) II e III estão corretas
- c) II e III estão incorretas
- d) III e IV estão corretas
- e) III e IV estão incorretas

Questão 16

Sobre as condutas da enfermagem em casos de dengues, leia as afirmações abaixo:

- () Pela classificação de risco, estratifica-se os pacientes em quatro grupos: A, B, C e D.
- () Pacientes do grupo A, não tem risco social e devem agendar retorno para reavaliação clínica entre terceiro e sexto dia da doença.
No grupo B os pacientes devem permanecer acomodados em
- () cadeira/poltrona ou leito para observação enquanto aguardam reavaliação clínica

- () Para pacientes classificados no grupo B, deve-se oferecer e manter hidratação oral supervisionada, por no máximo 3 horas.
- No grupo C, os pacientes devem ficar internados por no mínimo 24 horas, deve-se providenciar acesso venoso periférico calibroso,
- () promover reposição volêmica imediata e fazer controle rigoroso do gotejamento da infusão venosa;
- () O grupo D agrupa pacientes em choque e que precisam de atendimento imediato.
- O atendimento inicial dos pacientes classificados no grupo D pode acontecer em qualquer nível de complexidade, deve se realizar
- () reposição volêmica imediata e inclusive durante eventual transferência para uma unidade de referência.

Sobre as condutas acima, classifique cada afirmativa como verdadeira (V) ou falsa (F). A alternativa que apresenta a sequência correta de respostas é:

- a) V-F-V-V-F-V-V
- b) V-F-V-V-F-V-F
- c) V-V-V-F-F-V-V
- d) F-V-V-F-F-V-F
- e) V-F-V-V-F-V-F

Questão 17

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica são atribuições específicas do Enfermeiro:

- I - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;
- II - Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito;
- III - Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;
- IV - Realizar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal;

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e II estão corretas;
- b) II e IV estão incorretas;
- c) II e IV estão corretas;
- d) I e II estão incorretas;
- e) III e IV estão corretas;

Questão 18

D. Maria, 64 anos procura a unidade de saúde em que é cadastrada, para avaliação do pé diabético. A última vez que fez essa avaliação foi há 6 meses. Na avaliação o enfermeiro presença de úlcera

Considere as seguintes situações sobre infecção em pé diabético:

- I. Úlcera com exsudato purulento, celulite menor que 2cm do bordo da úlcera, paciente sem outras complicações locais ou sistêmicas.
- II. Úlcera com exsudato purulento, dor, rubor, calor e edema no local, paciente com febre, taquicardia, hipotensão e leucocitose.
- III. Úlcera com exsudato purulento, dor e calor no local, celulite maior que 2cm do bordo e comprometimento de músculo e tendão.
- IV. Úlcera sem exsudato purulento, paciente sem outras complicações locais ou sistêmicas;
- V. Úlcera com exsudato purulento, dor e calor no local, infecção se limita aos tecidos subcutâneos superficiais, paciente sem outras complicações locais ou sistêmicas.

As úlceras descritas acima podem ser classificadas respectivamente como:

- a) Infecção moderada; infecção grave; infecção grave; sem infecção; infecção moderada.
- b) Infecção leve; infecção grave; infecção grave; sem infecção; infecção moderada.

- c) Infecção leve; infecção grave; infecção moderada; sem infecção; infecção moderada.
- d) Infecção moderada; infecção grave; infecção grave; sem infecção; infecção leve.
- e) Infecção leve; infecção grave; infecção moderada; sem infecção; infecção leve.

Questão 19

Leia as informações abaixo sobre febre amarela:

I – No ciclo silvestre da febre amarela o homem é um hospedeiro acidental, já no ciclo urbano o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica.

II – A vacina contra febre amarela pode ser realizada a partir dos 6 meses de idade.

III – Para crianças menores de 2 anos de idade nunca vacinadas com vacina de febre amarela, essa não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral, nem com tetra viral. O intervalo indicado entre as vacinas é de 30 dias.

IV – É contraindicada a vacinação para pessoas infectadas pelo HIV com imunossupressão grave, ou seja, aqueles com contagem de células CD4 <200 células/mm³ ou menor de 15% do total de linfócitos para crianças menores de 13 anos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) A alternativa I está incorreta, pois homem como hospedeiro tem importância também ciclo silvestre.
- b) A alternativa II está correta.
- c) A alternativa III está correta, porém existem situações especiais que podem impossibilitar o cumprimento desse limite.
- d) A alternativa III está incorreta, pois o intervalo mínimo é de 40 dias.
- e) A alternativa IV está incorreta, pois essa condição é apenas em crianças menores de 11 anos.

Questão 20

Sobre a Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem na Saúde Coletiva, são realizadas as seguintes asserções:

- I. Trata-se de uma sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno, a assistência ou o cuidado de enfermagem articulado aos processos de produção e reprodução social, referentes à saúde-doença em uma coletividade.

PORQUE

- II. A Teoria de Intervenção Prática da Enfermagem na Saúde Coletiva visa conhecer o objeto de trabalho, aqui podendo ser considerado o perfil epidemiológico, assistência a família, indivíduos ou grupos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção **correta**.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.