

**UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIÚMA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA**

**EDITAL ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE DA FAMÍLIA
NÚCLEO PROFISSIONAL: ENFERMAGEM**

11- Com base no Caderno da Atenção Básica nº 37/2013. A principal finalidade da Linha de Cuidado da HAS é:

- a) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS rastreando a Hipertensão em todos os ciclos da vida;
- b) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS por meio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de atenção;
- c) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS aferindo a PA dos usuários com mais de 40 anos;
- d) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS fornecendo os medicamentos adequados para o tratamento;
- e) Fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com HAS por meio exclusivo da mudança de Estilo de Vida (MEV).

12- Com base no Caderno da Atenção Básica nº 37/2013. O Diagnóstico da HAS consiste na:

- a) Média aritmética da PA maior ou igual a 150/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas;
- b) Média aritmética da PA maior ou igual a 160/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas;
- c) Média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas;
- d) Média aritmética da PA maior ou igual a 140/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas;
- e) Média aritmética da PA maior ou igual a 150/100mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas;

13- Conforme Brasil, 2010. Os efeitos adversos mais comuns nas primeiras semanas de tratamento antirretroviral em gestantes são:

- a) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica pode levar à necessidade de postergar o início do tratamento;
- b) Diversos daqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica pode levar à necessidade de postergar o início do tratamento;
- c) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica nunca leva à necessidade de postergar o início do tratamento;
- d) Diversos daqueles que ocorrem com os adultos em geral e, a ocorrência de hiperêmese gravídica indica a necessidade de adiantar o início do tratamento;
- e) Semelhantes àqueles que ocorrem com os adultos em geral com exceção do aborto que atinge a maioria das gestantes;

14- Com base no Caderno da Atenção Básica n° 32/2012. Corresponderem respectivamente a sinal de presunção, probabilidade e certeza de gravidez:

- a) Atraso Menstrual, Amolecimento da Cérvix Uterina e BCF +;
- b) Paredes vaginais aumentadas, Atraso Menstrual, e BCF +
- c) Amolecimento da Cérvix Uterina, pulsação da artéria vaginal e BCF +;
- d) BCF +, Aumento do volume das mamas e Atraso Menstrual;
- e) Hipersensibilidade nos mamilos, Saco gestacional observado na USG e aumento da vascularização da parede vaginal;

15-Com base no Caderno da Atenção Básica n° 32/2012. NÃO faz parte das condutas gerais da primeira consulta de Pré-natal:

- a) Interpretar os dados da anamnese, o exame clínico/obstétrico e a instituição de condutas específicas;
- b) Definir o tipo de parto
- c) Orientar a gestante sobre a alimentação e o acompanhamento do ganho de peso gestacional;
- d) Incentivar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses;
- e) Fornecer todas as informações necessárias e respostas às indagações da mulher, de seu companheiro e da família;

16-Com base no Caderno da Atenção Básica n° 33/2012. A primeira consulta de Enfermagem ao recém-nascido na ABS deverá ocorrer:

- a) Com 15 dias de vida;
- b) Com 40 dias de vida quando a mãe retorna para Consulta com médico;
- c) Quando o coto umbilical estiver mumificado;
- d) Na sua primeira semana de vida;
- e) Quando a amamentação estiver estabelecida;

17- A faixa etária para vacinação da febre Amarela conforme calendário vacinal é:

- a) De 12 meses a 59 anos
- b) De 9 meses a 59 anos
- c) De 9 meses a 49 anos
- d) De 12 meses a 49 anos
- e) De 12 meses a 39 anos

18- Com base na Resolução do COFEN N° 358 de 2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde as cinco etapas do Processo de Enfermagem.

- a) Coleta de Dados de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem segundo a NANDA, Planejamento de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem;
- b) Histórico de Enfermagem, Subjetivo, Objetivo, Diagnóstico de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem;
- c) Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem;
- d) SOAP: Subjetivo, Objetivo, Avaliação de Enfermagem, Plano de Enfermagem e Implementação de Enfermagem;
- e) SOAP: Coleta de Dados subjetivos e objetivos, Avaliação de Enfermagem com diagnóstico de Enfermagem e Plano de Enfermagem;

19-Com base na Resolução do COFEN N° 358 de 2009 que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem. O Diagnóstico de Enfermagem se caracteriza por:

- a) Processo de Interpretação e agrupamento dos dados coletados (julgamento clínico) que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados;
- b) Processo de coleta de dados das informações que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados;
- c) Processo de Intervenção dos dados coletados que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados;
- d) Processo de Histórico de Enfermagem que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados;
- e) Processo de Enfermagem e dados coletados que culmina com a tomada de decisão sobre as respostas humanas e subsidia a seleção das ações para o alcance dos resultados esperados;

20-Em relação a classificação ou foco dos Diagnósticos de Enfermagem (DE), assinale a alternativa correta.

- a) Um DE pode ser focado em um problema, uma doença ou um sintoma;
- b) Um DE pode ser focado em um problema, um estado de promoção da saúde ou um risco potencial;
- c) Um DE pode ser focado em uma doença já diagnosticada pelo médico ou um risco potencial;
- d) Um DE pode ser focado em um problema, um sinal ou sintoma ou um estado de promoção da saúde;
- e) Um DE pode ser focado em uma situação real, potencial ou histórica que já tenha sido resolvida;