

NUCLEO PROFISSIONAL / ÀREA ESPECIFICA ODONTOLOGIA

QUESTÃO 16

Com relação às mulheres grávidas, o período gestacional considerado ideal para a realização de tratamento odontológico é:

- a) Do primeiro ao terceiro mês, pois o feto ainda está se desenvolvendo, não causando desconforto para a gestante.
- b) Do quarto ao sexto mês, porém deve-se atentar à mudança brusca da posição supina para a posição em pé, evitando-se a hipotensão postural.
- c) Do quinto ao sétimo mês, pois o bebê está em crescimento e a gestante tem menos náuseas.
- d) Do sétimo ao nono mês, pois o bebê já está formado e não há problemas para a gestante.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 17

Um paciente procura por tratamento odontológico, queixando-se de sangramento gengival espontâneo. Na anamnese, o paciente relata febre, mal-estar, perda de peso e equimoses. Ao exame intraoral o profissional observa petéquias, hematomas e sangramento desproporcional à quantidade de placa bacteriana presente. Com base nesses sinais e sintomas, a conduta profissional deve ser:

- a) Solicitar exames complementares e, de acordo com o resultado, orientar o paciente e encaminhá-lo a um especialista.
- b) Recomendar ao paciente procurar um hematologista para estabelecer o diagnóstico.
- c) Mediar com antibiótico e, após remissão da febre, iniciar o tratamento odontológico.
- d) Realizar tratamento periodontal, manter o paciente em observação e, se necessário, encaminhá-lo para um especialista.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 18

A inserção da Saúde Bucal na estratégia Saúde da Família representou a possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços para dar resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o estabelecimento de vínculo territorial, (MS-2011): Existem dois tipos de ESB: modalidade I e modalidade II; qual a composição da equipe de ESB modalidade I:

- a) Cirurgião-Dentista (CD), Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e Técnico em Saúde Bucal (TSB).
- b) Cirurgião-Dentista (CD), Técnico em Saúde Bucal (TSB).
- c) Cirurgião-Dentista (CD) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB).
- d) Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e Técnico em Saúde Bucal (TSB).
- e) Cirurgião-Dentista (CD), Auxiliar em Saúde Bucal (ASB); e Auxiliar de Enfermagem.

QUESTÃO 19

Mãe leva uma criança ao consultório odontológico relatando que a criança apresenta mal-estar, febre, perda de apetite há três dias e dor na boca. Ao exame clínico, o dentista observa a presença de ulcerações na mucosa e gengivite generalizada. Esse quadro clínico é característico de>

- a) Gengivite ulcerativa necrosante.
- b) Candidose pseudomembranosa.
- c) Ulceração aftosa recorrente.
- d) Gengivoestomatite herpética primária.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 20

Na avaliação pré-anestésica de um paciente que será submetido à anestesia geral, observou-se que, com a boca aberta, a língua do paciente faz contato direto com o palato duro, não sendo possível visualizar outras estruturas anatômicas. Essa situação é classificada como Mallampati:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) Nenhuma resposta está correta.

QUESTÃO 21

Paciente M.M.O., de 23 anos, do gênero masculino, apresenta-se com febre alta, náusea, vômitos, proptose do olho direito, oftalmoplegia, dificuldade de visão no mesmo olho. Relatou que esse quadro se iniciou após o tratamento de canal do elemento dentário 16 e inchaço na face. Esse paciente apresenta, provavelmente,

- a) Sinusite maxilar.
- b) Sinusite em seio etmoidal.
- c) Sinusite em seio frontal.
- d) Trombose do seio cavernoso.
- e) Nenhuma resposta está correta.

QUESTÃO 22

Criança de 11 anos, do gênero feminino, bateu a boca no chão. Ao exame intraoral, observa-se que apenas a borda incisal do elemento dentário 21 está visível em nível de margem gengival. Esse dente:

- a) Está intruído.
- b) Apresenta fratura coronária.
- c) Precisa de radiografias periapicais em vários ângulos para diagnóstico diferencial.
- d) É um remanescente do elemento original e necessita ser extraído.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 23

A cárie da primeira infância é multifatorial. As evidências científicas apontam que um dos fatores determinantes para essa doença é:

- a) O aleitamento materno.
- b) O baixo nível socioeconômico da família.
- c) A introdução de alimentos (fruta) antes do sexto mês de vida.
- d) O uso de dentífrício sem fluoreto.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 24

Um dos fatores primários para a ocorrência de erosão dental na primeira infância é:

- a) O uso prolongado de mamadeira.
- b) O refluxo gastroesofágico.
- c) O uso de refrigerantes.
- d) A leucemia.
- e) Todas as respostas estão corretas.

QUESTÃO 25

Dentífrícios fluoretados reduzem comprovadamente a ocorrência de cárie em crianças e adultos. Então, para a prevenção da fluorose dental, em crianças menores de quatro anos com atividade de cárie, deve-se:

- a) Contraindicar o uso de dentífrícios fluoretados.
- b) Recomendar o uso de dentífrícios com 500 ppm de fluoreto.
- c) Recomendar dentífrícios com fluoreto de sódio, ao invés de monofluorofosfato de sódio.
- d) Recomendar o uso de dentífrícios contendo 1000 a 1100 ppm de fluoreto.
- e) Nenhuma resposta está correta.