

## NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

### Questão 11

Segundo a classificação adotada pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (HA), o limite escolhido para definir HA é:

- a) Maior de 200/100 mmHg quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.
- b) Igual ou maior de 120/80 mmHg quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.
- c) Igual ou maior de 140/90 mmHg quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.
- d) Maior de 160/100 mmHg quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.
- e) Maior de 180/100 mmHg quando encontrado em pelo menos duas aferições, realizadas em momentos diferentes.

### Questão 12

Segundo Brasil, 2002. A justificativa para a abordagem conjunta da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus é devido a:

- a) Possibilidade de associação das duas doenças (90%), o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente.
- b) Possibilidade de associação das duas doenças (10%), o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias numa mesma família.
- c) Possibilidade de associação das duas doenças (20%), o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente.
- d) Possibilidade de associação das duas doenças (50%), o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente.
- e) Possibilidade de associação das duas doenças (100%), o que requer, na grande maioria dos casos, o manejo das duas patologias num mesmo paciente.

### Questão 13

Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes *mellitus*.

- a) A HA e o DM constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças pulmonares.

- b) A HA e o DM constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças cardiovasculares.
- c) A HA e o DM constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças geniturinárias.
- d) A HA e o DM constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças gastrointestinais.
- e) A HA e o DM constituem os principais fatores de risco populacional para as doenças oftálmicas.

#### Questão 14

São características clínicas do Diabetes *mellitus* tipo 1:

- a) Maior incidência em idosos; Pouca influência hereditária; Deterioração clínica, se não tratada imediatamente com insulina.
- b) Obesidade diagnosticada, especialmente de distribuição Abdominal, Forte componente hereditário.
- c) Maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens; Pouca influência hereditária; Deterioração clínica, se não tratada imediatamente com insulina.
- d) Maior incidência em crianças, adolescentes e adultos jovens, obesidade e forte componente hereditário.
- e) Maior incidência em adultos jovens; Pouca influência hereditária; Deterioração clínica, se não tratada imediatamente com insulina.

#### Questão 15

A PORTARIA Nº 4.279, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto a RAS é CORRETO afirmar que:

- a) É definida como os recursos municipais de saúde relacionados a APS para conferir integralidade da atenção á saúde municipal.
- b) É definida como os recursos para atenção á saúde quando há necessidade de exames e medicamentos de alto custo para aumentar a resolutividade da atenção á saúde municipal.
- c) É definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
- d) É definida como apoio aos serviços de referência e especialidades para aumentar a universalidade da atenção á saúde municipal.

e) É definida como apoio aos serviços de referência e especialidades para aumentar a integralidade da atenção à saúde municipal.

#### Questão 16

Para assegurar resolutividade na rede de atenção, na lógica da Redes de Atenção à Saúde, (RAS 4279/2010), alguns fundamentos precisam ser considerados. Assinale a alternativa que melhor representa estes fundamentos.

- a) Resolutividade; Assistência à Saúde e Qualidade.
- b) Economia de Escala; Qualidade; Suficiência; Acesso e Disponibilidade de Recursos.
- c) Universalidade; Acessibilidade e Assistência à Saúde em Redes.
- d) Equidade; Indicadores Epidemiológicos; Qualidade; Assistência à Saúde na APS e Municipalização.
- e) Economia de Escala; Universalidade; Qualidade; Acesso e Equidade.

#### Questão 17

Uma senhora de 60 anos, vida sexual ativa, com antecedentes familiares de câncer de colo de útero (irmã faleceu devido a complicações metastásicas), realizou último Exame de Papanicolau com 40 anos. Sabendo-se que tal neoplasia é uma doença de ação gradativa que se inicia com alterações neoplásicas intraepiteliais (NIC), as quais podem evoluir para um processo invasivo em um período médio de 10 a 20 anos, a orientação quanto à periodicidade do exame deve ser:

- a) Sempre que surgir sintomatologia ginecológica.
- b) Semestral, independente de sintomatologia ginecológica.
- c) Em 1 ano, após 2 exames semestrais com resultados negativos.
- d) Em 3 anos, após 2 exames anuais consecutivos com resultados negativos.
- e) Sempre que a mulher sentir dor ou tiver sangramento.

#### Questão 18

Senhora Michele, 45 anos, auxiliar de serviços gerais, 2º grau completo, mãe de um filho (João de 03 anos), menarca aos 12 anos, ciclo menstrual regular, faz uso de contraceptivo oral. Ela retornou à consulta de enfermagem de seguimento com a enfermeira Susane, de uma unidade de saúde, e relatou presença de um caroço na mama esquerda ao realizar o auto-exame. Diante do caso, quais são os possíveis fatores que aumentam o risco do câncer de mama?

I - Primeira gestação tardia, menarca precoce, menopausa precoce;

II - História familiar com casos de câncer de mama principalmente em parentes de primeiro grau e antes dos 50 anos, ingestão de bebida alcoólica;

III – Exposição à radiação, menopausa tardia, menarca precoce e aleitamento materno;

IV – Nuliparidade, etilismo, uso prolongado de anticoncepcionais e obesidade

Estão corretos apenas os fatores

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e IV.
- e) II e III.

#### Questão 19

Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (2008), analise as afirmativas a seguir:

I - A violência é um fenômeno difuso, complexo, multi-causal, com raízes em fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e psico-biológicos, que envolve práticas em diferentes níveis.

II - O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação, em relação à sofrida pelas mulheres (Souza, 2005).

- a) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa;
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras;
- c) As duas asserções são proposições falsas;
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é uma proposição verdadeira;
- e) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda comprova a primeira;

#### Questão 20

De acordo com o Ministério da Saúde (2009). Qual situação que não há restrição ao aleitamento materno:

- a) Mães infectadas pelo HIV;
- b) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2;
- c) Mães em uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação;
- d) Mães com necessidades especiais (limitações físicas, auditivas e visuais);
- e) Mães com AIDS