

NÚCLEO PROFISSIONAL / ÁREA ESPECÍFICA: ENFERMAGEM

QUESTÃO 11

Para Cubas e Santos (2012), o conceito de Linhas de Cuidado (LC) aparece nos últimos anos como uma possibilidade de compreensão e reorganização dos serviços de saúde, de forma a atender as necessidades a partir de um aporte das vulnerabilidades em saúde. Neste contexto é CORRETO afirmar que:

- a) A Linha de Cuidado é por essência a oferta de um “cardápio” de ações previstas a partir das possibilidades do sistema de saúde, bem como dos diversos níveis de atenção à saúde.
- b) A Linha de Cuidado é por essência a integração do sistema de saúde, bem como dos diversos níveis de atenção a saúde, com garantia de fluxos assistenciais integrados.
- c) A Linha de Cuidado é por essência programação e articulação com objetivo de promover um itinerário assistencial que garanta exclusivamente a atenção coletiva.
- d) A Linha de Cuidado tem por essência envolver a vontade política na direção da reorganização da assistência com vistas a atender as diferentes instâncias da atenção a saúde de forma desintegrada.
- e) A Linha de Cuidado tem por essência priorização de ações de saúde com foco na clínica.

QUESTÃO 12

O artigo 6º da resolução 358/09 afirma que a execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo:

- a) Resumo dos dados coletados; Diagnósticos de Enfermagem; Ações ou intervenções de Enfermagem e Resultados alcançados.
- b) Resumo dos dados coletados; Análise Clínica de Enfermagem; Ações ou intervenções de Enfermagem e Resultados esperados.
- c) Resumo dos dados coletados; Diagnósticos de Enfermagem; Plano de Enfermagem e Resultados esperados.
- d) Resumo dos dados coletados; Análise Situacional da comunidade; Ações ou intervenções de Enfermagem e Resultados alcançados.
- e) Resumo dos dados objetivos coletados; Diagnósticos multidisciplinares; Planos, Ações ou intervenções de Enfermagem e Resultados alcançados.

QUESTÃO 13

Quanto a dermatite amoniacal é INCORRETO afirmar que:

- a) Não ocorre infecção secundária por cândida ou por bactérias.
- b) É uma dermatite de contato por irritação primária, caracterizada por irritação na pele, causada pelo contato com a urina e as fezes retidas pelas fraldas
- c) As lesões variam de eritematosas exsudativas a eritemato-papulosas e descamativas nas áreas convexas da região delimitada pelas fraldas
- d) O uso de pós, óleos, sabões e pomadas irritantes agravam o quadro clínico.
- e) Cuidados higiênicos, troca frequente de fraldas ou retiradas das mesmas melhoram o quadro clínico.

QUESTÃO 14

Segundo o Caderno de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento (Brasília 2010). Qual a principal causa de Internação Hospitalar e de Mortalidade em Idosos:

- a) Doenças do Aparelho Respiratório
- b) Doenças do Aparelho Digestivo
- c) Doenças do Aparelho Circulatório
- d) Neoplasias
- e) Doenças do Aparelho Geniturinário

QUESTÃO 15

São exemplos de Diagnósticos de Enfermagem Real e de Risco Respectivamente:

- a) Disposição para sono melhorado caracterizada por relato de sentir-se descansado após dormir; Risco de lesão relacionado a desnutrição.
- b) Disfunção sexual relacionada a abuso físico caracterizada por deficiência percebida de desejo sexual; Confusão crônica relacionada a doença de Alzheimer caracterizada por personalidade alterada.
- c) Risco de quedas relacionado a incontinência; Tristeza crônica relacionada a crises no controle da deficiência.

- d) Padrão respiratório ineficaz relacionado a obesidade caracterizado por dispneia; Risco de Infecção relacionado a doença crônica.
- e) Disposição para relacionamento melhorado caracterizado por demonstração de respeito mútuo entre os parceiros; Risco de confusão aguda relacionado a história de AVC;

QUESTÃO 16

Segundo o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (Brasília 2006). São Critérios de risco para infecção cervical EXCETO:

- a) Parceiro com sintomas.
- b) Paciente com múltiplos parceiros, sem proteção.
- c) Paciente acredita ter se exposto a DST.
- d) Paciente proveniente de áreas de alta prevalência de gonococo e clamídia.
- e) Paciente com exame de colpocitologia oncótica em atraso.

QUESTÃO 17

5- Durante campanha de busca ativa de tuberculose na maior empresa da área de abrangência da UBS você identificou uma pessoa com resultado de baciloscopia de escarro positiva (+) para Tuberculose. Sua conduta deve ser, além de providenciar o início imediato do tratamento do paciente.

- a) Notificar o caso à autoridade sanitária e orientar a realização do exame de escarro aos contatos domiciliares que apresentem tosse há mais de 3 semanas
- b) Recomendar isolamento respiratório do doente no domicílio até a negatificação do exame e pedir cultura de escarro dos contatos domiciliares que tenham sintomatologia associada a tuberculose ou a Aids.
- c) Pedir radiografia de tórax dos adultos que moram com o doente e iniciar quimioprofilaxia para as crianças abaixo de 7 anos independente do estado vacinal
- d) Aplicar teste tuberculínico nas pessoas que dividem ambiente de trabalho com o doente e realizar vacina BCG-id nos comunicantes domiciliares do caso.
- e) Aplicar teste tuberculínico nas pessoas que dividem ambiente de trabalho com o doente e pedir cultura de escarro dos contatos domiciliares que tenham sintomatologia associada a tuberculose ou a Aids.

QUESTÃO 18

Em relação ao diabetes mellitus, preencha os espaços com (1) para Diabetes do Tipo I e (2) para Diabetes do tipo II.

- () Atinge, principalmente, crianças e adolescentes.
- () Ocorre preferencialmente em indivíduos obesos.
- () Mais característico da fase adulta.
- () O paciente é insulino-dependente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 1, 2, 1, 2.
- b) 1, 2, 2, 1.
- c) 2, 1, 1, 2.
- d) 2, 1, 2, 1.
- e) 2, 2, 1, 1.

QUESTÃO 19

Dentre as orientações das VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, na verificação da pressão arterial em membro superior, o paciente deve ser mantido:

- a) Sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado com o braço abaixo do coração, livre de roupas, palma da mão voltada para baixo e o cotovelo esticado.
- b) Em posição ortostática, pés apoiados no chão, com o braço na altura do coração, livre de roupas, a palma da mão voltada para cima e o cotovelo fletido.
- c) Sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
- d) Sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para baixo e o cotovelo ligeiramente fletido.
- e) Em posição ortostática, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.

QUESTÃO 20

No ser humano, alguns agentes infecciosos e parasitários atuam como fatores de risco inter-relacionados que acabam interferindo em diferentes estágios do desenvolvimento tumoral. Relacione o agente infeccioso ou parasitário com o tumor correspondente.

- 1) Epstein-Barr
- 2) HPV (vírus papiloma humano)
- 3) Vírus da Hepatite B
- 4) Vírus da AIDS
- 5) Helicobacter pylori

A – Câncer de Colo uterino

B – Linfomas e carcinoma de nasofaringe

C – Adenocarcinoma de estômago

D – Sarcoma de Kaposi

E – Hepatocarcinoma

- a) 1B, 2A, 3E, 4D, 5C;
- b) 1E, 2B, 3D, 4C, 5A;
- c) 1C, 2A, 3E, 4B, 5D;
- d) 1E, 2A, 3B, 4C, 5D;
- e) 1A, 2E, 3B, 4D, 5C.